

เดาวัลย์รุกรานน้ำเพชรส่อเคาะสูญจระเข้

จากการณีเดาวัลย์รุกรานป่าในอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี จนล่าสุดอธิบดีกรมอุทยานฯ
คนใหม่ เดินทางถึงจังหวัดฯทำงานแบบครึ่งทีม ศึกษา
วิจัยเพื่อลงมือแก้ไขก่อนที่จะบานปลายมากขึ้น ขณะที่
ในอุทยานฯยังคงเกิดสภาพ “ป่าดงดิบ” อย่างต่อเนื่องนั้น
โดยที่แม่น้ำเฉพาะกิจภูมิภาค “ไทยรัฐ” รายงานความ
สืบเนื่องเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. นายสุรพล นาคนคร อธิการบดี
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ภูจิตภา เปิดเผยว่า จากที่ได้
เข้าไปสำรวจพื้นที่ป่าธรรมชาติบ้านวังท่าในอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน ซึ่งเป็นบริเวณป่าต้นน้ำเพชรบุรี และเป็นถิ่น
อาศัยของจระเข้แม่น้ำจืดที่มีมีการขยายพันธุ์อยู่ตามธรรมชาติ
แหล่งเดียว และแหล่งสุดท้ายของประเทศไทย และเป็น
1 ใน 3 แห่งของโลกที่ยังเหลืออยู่ พบภาพเกิดความวิตก
ถึงวาทะเพิ่มขึ้นจากปัญหาเดาวัลย์ในป่าแก่งกระจาน
เนื่องจากขณะนี้เดาวัลย์ได้รุกรานเข้าไปถึงถิ่นอาศัยของ
จระเข้แม่น้ำจืดแห่งนั้นแล้ว หากไม่ได้รับการแก้ไขโดยด่วน
การขยายตัวของเดาวัลย์จะเพิ่มมากขึ้นทำให้ยากต่อการ
แก้ไข เช่นที่ถ้ำถ้ำมีปัญหาน้ำอยู่ในขณะนี้ในคืนป่ารุ่น 2 ที่
กำลังมีการรุกรานของฝูงเดาวัลย์ในจุดนี้จะเกิดผลกระทบ
ขึ้นรุนแรง ทำให้เห็นแหล่งวางไข่ของจระเข้แม่น้ำจืดในที่ที่
เคยไป ซึ่งเป็นปัญหาหากมีการขยายพันธุ์ของจระเข้ตามอาจ
ถึงขั้นสูญพันธุ์ได้

นายสุรพลเผยต่อว่า การรุกรานของเดาวัลย์ขณะนี้
จะเป็นจุดอ่อนในทางสำคัญในการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลก ที่เน้นเรื่องไขความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะ
หากไม่ได้รับการแก้ไขเร่งด่วน นอกจากจะไม่กระทบกับ
แหล่งจระเข้ธรรมชาติแล้ว ยังจะกระทบกับการเป็นแหล่ง
ศึกษาเพชรบุรีให้ห่อหุ้มขาว จ.เพชรบุรี ด้วย ล่าสุด
ตนจึงได้มอบเอกสาร รวมทั้งภาพและวิดีโอไปสำนัก
ข่าวไทยบันทึกความเปลี่ยนแปลงของป่าที่ศึกษาเดาวัลย์

ไว้ จากการบินถ่ายทางอากาศมาตลอดตั้งแต่ปี 2552-
2553 ไม่นายชัยวัฒน์ สัมผัสจิตอักษร หัวหน้าอุทยานฯ
และ ดร.วัฒนา สักดิ์ขุมมี หัวหน้าทีมศึกษาวิจัยป่า
เดาวัลย์ นำไปเข้าสู่การประชุมคณะทำงานชุดใหญ่ของ
สำนักวิทยกรมอุทยานฯ เพื่อให้คณะศึกษาวิจัยดูสภาพ
การขยายตัวของกลุ่มเดาวัลย์ที่ทุกสปีชีส์เข้าสู่ธรรมชาติ
อย่างรวดเร็ว โดยจะได้วางแผนการศึกษาวิจัยให้ครอบคลุม
ปัญหา เพราะเป็นปัญหาที่ไม่ค่อยพบหรือปรากฏมาก่อน
แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้จากธนาคารเพื่อการพัฒนา
แห่งเอเชีย (เอทีบี) มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มูลนิธิโลกสีเขียว
ได้ระบุแล้วว่าสถานการณ์ของป่าแก่งกระจานเข้าขั้นวิกฤติ
ล่อทั้งพืชและสัตว์ป่า

อย่างไรก็ตามสำหรับจระเข้แม่น้ำจืดของไทยเหล่านี้
อยู่ในวงศ์ CROCODYLIDAE Crocodylus siamensis
Schneider 1801 เป็นจระเข้ขนาดปานกลาง มีลำตัว
ยาวประมาณ 3 เมตร สังกัดได้จากกรมีแฉกเกล็ดบน
บนท้ายทอย และมีสันเตี้ยอยู่ระหว่างสากทั้งสองข้าง ก้น
ปลาเป็นอาหารหลัก และจะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หาก
ยังมีปลาชุกชุมอยู่ในบริเวณนั้น ขนาดโตเต็มที่เมื่อมีอายุ
10-12 ปี การผสมพันธุ์จะเริ่มในเดือน ธ.ค.-มี.ค. วางไข่
ระหว่างเดือน เม.ย.-พ.ค. มีการสร้างรังเป็นกองพืชไม้
วางไข่ครั้งละ 20-40 ฟอง ไข่ที่ฟักออกเป็นตัวในเวลา 67-
68 วัน ตัวเมียจะเฝ้ารังและช่วยขุดลูกออกจากกองรัง อาศัย
อยู่ตามทะเลสาบน้ำจืดในที่ราบ บึง หนอง และแม่น้ำ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่แยกออกมาจากแม่น้ำแม่ และลำธาร
ที่น้ำไหลเอื่อยที่มีฝั่งเป็นโคลน ปัจจุบันแทบจะไม่มีพบ
จะข้ามลำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ยกเว้นในอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจานเพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่ยังไม่ทราบจำนวน
ที่แน่ชัด ซึ่งมีจำนวนอนุรักษ์ CITES ได้ขึ้นบัญชีจระเข้
น้ำจืดชนิดนี้ไว้ใน Appendix 1 แล้ว.