

ทึนปราบตะลิงเถาวัลย์ยึกป่ามีมากเกินคาด

จากกรณี “ไทยรัฐ” เสนอปัญหาผู้เถาวัลย์หลากหลายชนิดแพร่กระจายรุกรานเข้าไปกินป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี จนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและวิถีชีวิตของสัตว์ป่า ตามข่าวที่เสนอมาตามลำดับ ล่าสุด ทีมข่าวเฉพาะกิจภูมิภาค “ไทยรัฐ” รายงานความคืบหน้าเมื่อวันที่ 26 พ.ค. ดร.ธนา ลักดิ์ชูวงศ์ หัวหน้าทีมปราบเถาวัลย์ เผยว่า ตนได้จัดทำแปลงทดลองไว้ 9 แปลง แบ่งออกเป็น 3 จุด จุดละ 3 แปลง ใช้พื้นที่แปลงละ 1 ไร่ ทั้ง 3 จุด โดย 1 แปลงอยู่ในพื้นที่ป่าธรรมชาติที่มีเถาวัลย์ขึ้นตามปกติทั่วไป ส่วนอีก 2 แปลง อยู่ใกล้เส้นทางระหว่างรอยต่อของป่าธรรมชาติกับผืนป่าทุ่งสองที่มีเถาวัลย์ปกคลุมอย่างหนาแน่น โดยจะมีการติดตามในแปลงที่อยู่ในป่าทุ่งสองที่มีเถาวัลย์ขึ้นอย่างหนาแน่น 1 แปลง และอีก 1 แปลง ปลอ่ยไว้ไม่มีการตัดแต่งเช่นเดียวกับแปลงที่อยู่ในป่าธรรมชาติ จากนั้นจะเริ่มติดตามผลและเก็บข้อมูลจากแปลงทดลองทั้ง 9 แปลง ใน 3 จุด ในทุกๆ เดือน ไปจนกว่าจะครบ 6 เดือน แล้วจึงนำมาแปลผลสรุปว่ามีผลออกมาเช่นใด คาดว่าช่วงนั้นจะมีความชัดเจนว่าการจะต้องดำเนินการต่อไป

อย่างไร เพื่อให้เถาวัลย์อยู่คู่กับป่าได้ในระบบพืชพันธุ์เหมือนเดิม เมื่อได้ผลสรุปเรียบร้อยแล้วจะนำเข้าสู่กระบวนการแปลว่าสาธารณะ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและมีความเห็นร่วมกันอีกครั้ง

ขณะเดียวกัน ทีมปราบเถาวัลย์ได้เข้าสู่พื้นที่เพื่อตัดแต่งเถาวัลย์ในแปลงทดลองเป็นครั้งแรกตามหลักวิชาการที่ได้กำหนดจุดไว้อย่างเป็นทางการ โดยมีนายชิงชัย วิริยะบัญชา น.ส.กานุมาศ ลาดป่าละ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ จากสำนักวิทยบริการอุทยานแห่งชาติฯ และนายสุทัศน์ หรัพย์ญ์ หัวหน้างานศึกษาวิจัยระบบนิเวศน์และสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พร้อมทีมงานอีก 10 คน ลงพื้นที่ในบริเวณป่าโปร่งพรหม กม.8 เพื่อตรวจสอบแปลงวิจัยที่ 4 ซึ่งมีความกว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ที่ต้องตัดแต่งเปรียบเทียบกับแปลงทดลองอื่น โดยใช้เครื่องมือเก็บตรวจวัดการรับบ่อนปริมาณความหนาแน่นของต้นไม้ไม้หน่อ ไม้หลัก จำนวน และชนิดต่างๆของต้นไม้ และเถาวัลย์ เพื่อศึกษาวิจัยถึงวิธีการเจริญเติบโตของเถาวัลย์ รวมถึงเพื่อการศึกษาถึงเกิดผลความชัดเจนว่า ความหนาแน่นของเถาวัลย์ดังกล่าวจะเป็นอันตรายต่อสภาพความเป็น

ป่าในอนาคต ตามที่มีการคาดการณ์ไว้ในเบื้องต้นหรือไม่ แต่จากการทำงานเพื่อตัดแต่งและการเดินเท้าเข้าไปเก็บข้อมูลมวลสิ่งแวดลอมกลับเต็มไปด้วยความลำบาก เพราะสภาพพื้นที่ป่าขึ้นปกคลุมเถาวัลย์ปกคลุมหนาแน่นมาก

จากนั้นนายชิงชัย น.ส.กานุมาศ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ได้เปิดเผยว่า หลังจากทีมวิจัยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและเปรียบเทียบปริมาณของเถาวัลย์กับปริมาณของต้นไม้หลักแล้ว พบว่าเถาวัลย์ที่นำออกไป โดยในแปลงทดลองมีเถาวัลย์ประเภทต่างๆประกอบไปด้วย รวงจืด แก้วกิมวาว มะลิได้ใช้ไม้เครื่องมือตัดหนวดหนาม เครือประสมแดง เครือบานน้ำ หวายละมอย เครือแสงพระ คัดเจ้าหนู บุหงา จิงจ้อเหลือง เครือเถาวัลย์ ขมิ้นเครือเถาวัลย์แดง รวม 14 ชนิด คิดเป็น 94.44% ของพื้นที่ส่วนต้นไม้หลักและไม้ใหญ่ พบมีเหลือเพียง 6 ชนิด ประกอบไปด้วย อีโศ คานเลื้อย นางเลว ดอกแตก สามเสื่อ ข่อยหนาม คิดเป็น 5.56% ของพื้นที่เท่านี้ เมื่อเทียบกับแล้วจะเห็นได้ว่าเถาวัลย์หลากหลายชนิดเหล่านี้ได้ปกคลุมพื้นที่เกือบ 100% หากปล่อยทิ้งไว้ป่าที่เหลือจะถูกเถาวัลย์ปกคลุมจนสูญเสียนไม้หลักไปอย่างแน่นอน



เกินคาด ทีมปราบเถาวัลย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมอุทยานฯ ได้ลงพื้นที่ตัดแต่งเถาวัลย์ในแปลงทดลอง เพื่อตรวจสอบค่าความหนาแน่นของต้นไม้หลักในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี พบว่ามีเถาวัลย์ขึ้นปกคลุมหาสายต้นไม้รวม 100 เปอร์เซ็นต์.