

บทสารพัน



กำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระดับจังหวัด (War room) ซึ่งจากการตั้งวอร์รูมพบว่า จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายไพรัช หวังดี เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าการควบคุมสถานการณ์เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั้น ได้มีการตั้งคณะทำงานโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมีเกษตรจังหวัด ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี ศูนย์บริหารศัตรูพืช ตลอดจนนายอำเภอร่วมเป็นคณะทำงาน เรียกว่า สุพรรณบุรีโมเดล มีการแบ่งการดำเนินงานออกเป็นด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด มีการประเมินค่าเฉลี่ยถ้าพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในอัตรา 10 ตัว/จุด

จะต้องเร่งเข้าไปดำเนินการควบคุมทันที โดยใช้กับดักแสงไฟวางตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อกำจัดตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล นอกจากนี้ จะต้องมี การแจ้งสถานการณ์ให้เกษตรกรทราบเป็นระยะควบคู่กับการ

ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี ส่งผลให้ทุกวันนี้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่มีความ

สุพรรณบุรีโมเดล...

ความสำเร็จควบคุมเพลี้ยฯ



ใน ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาปัญหาใหญ่ของชาวนาคือ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาด ทำลายผลผลิตเสียหายอย่างหนัก ส่งผลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหานี้ และมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลก็ยังคงมีอยู่ให้เห็นจนถึงทุกวันนี้ นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า การป้องกันและควบคุมสถานการณ์เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้ออกมาตรการในการดำเนินการควบคุมการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมทั้งมีการตั้ง ศูนย์ป้องกัน



ถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้พันธุ์ข้าวและอัตราที่ทางราชการแนะนำ การใช้สารเคมีที่เหมาะสม

จากการร่วมมือกันของทุกฝ่ายมา

เข้าใจในวิธีการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตลอดจนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี มีการตรวจสอบแปลงนาของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบการ

ระบาดจะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ ทำให้สามารถ

ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันที่ อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อกับดักแสงไฟ เชื้อราชีวเวอเรียและเชื้อราไตรโคโมเนีย ส่งผลให้การดำเนินงานมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สังเกตได้จากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในปีนี้ เกิดแล้ว 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์และเมษายน พบพื้นที่ระบาดจำนวน 240,000 ไร่ แต่มีพื้นที่ได้รับความเสียหายเพียง 1,390 ไร่ และจาก



การประเมินสถานการณ์ขณะนี้พบค่าเฉลี่ยของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอยู่ที่ 0.1 ตัว/จุดเท่านั้น ซึ่งนับว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม ยังคงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตข้าวของชาวนา

ความสำเร็จในการแก้ไขปัญห
การแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ที่จังหวัดสุพรรณบุรี จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย
ถ้าขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ดังนั้น พื้นที่ใดที่ยังคงพบการ
ระบาดรุนแรงจะนำวิธีการของสุพรรณบุรี
โมเดลไปใช้บ้างก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่ง.