

จากปัญหาการแพร่ระบาดของ
หนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่พบการระบาดตั้งแต่
ปี 2550 จนถึงปี 2556 มีพื้นที่การระบาด
กว่า 77,266 ไร่ สร้างความเสียหายทาง
เศรษฐกิจให้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มา
อย่างยาวนาน

ไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตรเผยถึงการดำเนินโครงการ
ควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าวหรือหนอน
หัวดำ แบบครอบคลุมพื้นที่โดยใช้สารเคมี
ฉีดเข้าลำต้นว่า ปีที่ผ่านมาได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการ
ระบาดของหนอนหัวดำในโครงการควบคุม
และกำจัดศัตรูมะพร้าว แบบครอบคลุม
พื้นที่โดยใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้น ซึ่งได้
ดำเนินการในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย
นำผลการวิจัยจากกรมวิชาการเกษตร ที่
แนะนำให้ใช้สาร emamectin benzo-
ate 1.92% EC ฉีดเข้าลำต้นในอัตรา 30
มิลลิลิตรต่อต้น ในต้นมะพร้าวที่สูงมากกว่า
12 เมตร ยกเว้นมะพร้าวน้ำหอมและ
มะพร้าวกะทิ

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา กรมส่งเสริม
การเกษตรได้ดำเนินการฉีดสารดังกล่าว
ในพื้นที่ 6 อำเภอใน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ได้แก่ อ.สามร้อยยอด อ.กุยบุรี อ.เมือง
อ.ทับสะแก อ.บางสะพาน และ
อ.บางสะพานน้อย จำนวนทั้งสิ้น 900,575
ต้น ซึ่งก่อนเริ่มโครงการมีพื้นที่การ

หนอนชาวสวนเลี้ยง‘บราคอน’ ปราบหนอนหัวดำศัตรูมะพร้าว



ระบาดของหนอนหัวดำ 77,266
ไร่ เกษตรกร 7,283 ราย โดยหลังการ
ดำเนินงานฉีดสารเคมีเข้าลำต้นพบมีพื้นที่
การระบาดมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเมื่อเดือน
กรกฎาคม ที่ผ่านมา พบว่ามีพื้นที่การ
ระบาดลดลง 17,243 ไร่ คิดเป็น 22.31%
และระหว่างนี้ให้จังหวัดรวบรวมจำนวน
ต้นมะพร้าวที่พบการระบาดจากเกษตรกร
ที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือการ
ฉีดสารเคมีเข้าลำต้นเสนอขออนุมัติงบประมาณช่วยเหลือในระยะดำเนินงานต่อไป
ด้านมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวเสริมว่า ขณะนี้
ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวน
มะพร้าวในส่วนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ

สำรวจจำนวนต้นมะพร้าวที่มี
ปัญหาการระบาดของหนอน
หัวดำในสวนตนเอง โดย
นับจำนวนต้นมะพร้าวที่พบ
การระบาดและมีความสูง
มากกว่า 12 เมตร และ
มาแจ้งที่สำนักงานเกษตร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หรือสำนักงานเกษตรอำเภอ
ทุกอำเภอ โดยในส่วนของ

ต้นมะพร้าวที่มีความสูงต่ำกว่า 12 เมตร
แนะนำให้ใช้วิธีการตัดทางใบที่มีการระบาด
ลงมาเผาทำลาย จะช่วยทำลายหนอนหัวดำ
ในระยะไข่จนถึงตัวหนอนได้

“ในงานป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว
นั้น สิ่งสำคัญที่สุด คือ เกษตรกรจะต้อง
หมั่นสำรวจสวนมะพร้าวตนเอง ร่วมกัน
เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการระบาดได้ขยายตัวเพิ่ม
ออกไป หากพบการระบาดเกิดขึ้นในสวน
มะพร้าวตนเองให้เกษตรกรดำเนินการ
ป้องกันด้วยตนเองก่อน หรือหากมีความ
ประสงค์ให้ฉีดสารเข้าลำต้น ก็สามารถ
แจ้งได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือ
สำนักงานเกษตรอำเภอกัลยบ้าน” มงคล
กล่าว