

सुखासुखासुखासुखासुखासुखासुखासुखासुखासुखा

พี.สี.อ่อนวนหวานเริ่มระบาด จ.ประจวบ

ตลาด เกษตร

กลุ่มอาชักขาพืช สำนักงานเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายสมคิด เลิศมณฑล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอาชักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี นายบุญฤทธิ์ โภุมแท้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี และนายมลศักดิ์ พงศ์สุพัฒน์ เกษตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของผีเสื้อหวานหวานในมะม่วง

พร้อมกับได้ชี้แจงวิธีการป้องกันกำจัดผีเสื้อหวานหวาน ณ บ้านนายพนม ชำเพือก ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงส่องออกนอกฤดู บ้านวังมะเดื่อ ตำบลอ่าวน้อย ออำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่พบว่ามีเกษตรกรที่ประสบปัญหาการระบาดของผีเสื้อหวานหลายรายด้วยกัน

ผีเสื้อหวานหวาน เป็นผีเสื้อกลางคืนที่มีขนาดใหญ่ บินเร็ว ตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำหวานจากผลไม้ทุกชนิด ทำให้ผลไม้มีเกิดความเสียหาย และหล่อร่วน ผลไม้ที่เป็นอาหารของผีเสื้อหวาน ได้แก่ ลิ้นจี่ ลำไย ส้ม เปี๊ยะหวาน ส้มโอ มะม่วง เงาะ มะนาว อุ่น กล้วย พุทรา มะละกอ ลางสาด ลองกอง น้อยหน่า ฟรั่ง กระท้อน นังคุด

โดยผีเสื้อจะทำลายผลไม้โดยใช้ปากที่แข็งแรง ซึ่งมีน้ำยาตัดหัวแหงทะลุผ่านเปลือกของผลไม้สูกเข้าไปถูกกินน้ำหวานภายในเนื้อผลไม้ ผลที่ถูกเจาะจะเป็นรูทำให้น้ำหวานไหลลอก岡มาเป็นพื้นดินดูดแมลงชนิดอื่น ๆ ให้เข้ามาร้ำกล้ำข้ามเดินอีก

ผีเสื้อชนิดนี้จะวางไข่บนใบเริ่วนใบหญ้า ฟางข้าว โดยผีเสื้อจะวางไข่เป็นฟองเดียว ๆ สีเหลือง ใจกลางดอกอ่อนมาเป็นตัวภายใน 2-3 วัน หนอนที่ฟักออกมากจะกินใบอ่อนของพืช เมื่อได้เดินที่หนอนจะมีความยาวประมาณ 5-6 เซนติเมตร มีสีดำ น้ำตาล หรือสีน้ำเงินเข้ม ในการเจริญเติบโตระยะตัวหนอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 19-21 วัน จึงจะเข้าระยะดักแด้ และจะใช้เวลาในระยะนี้อีกประมาณ 12-14 วัน ที่จะฟักออกมาเป็นตัวผีเสื้อ



การเข้าสำรวจของพี.สี.อ่อนหวาน



มอบส...



ติดตามข้อมูล



ร่วมสำรวจ



สำรวจแปลง

ใบไม้แห้ง เมื่อหุบปีกจะมีลักษณะคล้ายหลังคา ส่วนปีกอยู่หลังจะมีสีเทา เหลืองอมส้ม และมีจุดดำคล้ายรูปไต่ประกอบอยู่อย่างเด่นชัดบนปีกทั้งสองข้าง ผีเสื้อจะมีอายุชุดได้ประมาณ 60 วัน

จัดเป็นแมลงที่เป็นศัตรุของพืชที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะผลไม้ที่มีเปลือกหนา ผีเสื้อหวานหวาน

ซึ่งจะเป็นผีเสื้อกลางคืนที่มีขนาด กีสามารถเจาะกินน้ำหวานได้

ใหญ่ เมื่อการปีกออกจะมีความกว้าง 7-10 เซนติเมตร ปีกอยู่หน้ามีสีน้ำตาลคล้ำลักษณะ สามารถทำได้ด้วยตนเองโดยทำลายวัชพืช

ยกระดับคุณภาพและคุณภาพในการเพาะปลูกกล้วย

นางสาวสิริพร ลิจิตวัฒน์ รอง ให้บุคลากรและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดำเนิน ได้มีความตระหนักรู้และเข้าใจถึงเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการแยกประโยชน์ของการค้าเสรี รวมทั้งทำความรู้เรื่องระดับธุรกิจเกษตรค้าสู่ภาค เรื่องกล้วย ลังกล้วยไปเผยแพร่ขยายผลสู่ผู้ส่วนงานที่รับผิดชอบโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รอบ เพื่อสร้างโอกาสและความเข้าใจด้านการ ณ โรงแรมมารวย การเดินทาง กรุงเทพฯ เมื่อ ค้าเสรี พฤติกรรมและความต้องการของผู้ซื้อ วันก่อน ในสินค้าที่เกษตรกรผลิตมุ่งสู่ตลาดการค้าเสรี

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ระหว่างประเทศ และเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง

หวานเริ่มระบาด จ.ประจวบคีรีขันธ์



การเข้าสำรวจของพืชสื่อ漫หวาน



มอบสภาพเพื่อไปพัฒนาได้แล้ว



ติดตามข้อมูล



ร่วมสำรวจ



สำรวจแปลง

ด้าน ๆ ที่อยู่ในบริเวณสวนหรือบริเวณใกล้เคียงเนื่องจากวัชพืชบางชนิดเป็นที่อยู่อาศัยของผีเสื้อมวนหวาน ผลไม้ที่สามารถห่อผลได้ เมื่อรึ่งสุกควรทำการห่อผล หรือใช้ไฟส่องจับ ในระยะที่ผลไม้ร่วนสุก เนื่องจากผีเสื้อมวนหวานเป็นแมลงกลางคืนและออกหากินในเวลากลางคืน เป็นแมลงที่มีขนาดใหญ่ทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน ควบคู่กับติดตั้งกันดักแสงไฟ เนื่องจากเป็น